

FABRICATION DU PIÈGE À FRELON



Percer 3 trous (diamètre 8.5mm)
Aux 2 /3 de la hauteur
à l'aide d'une pointe chauffée
ou un fer à souder.
Badigeonner ces derniers avec
du sirop de grenadine ou de cassis

Remplir le fond de la bouteille
(max 4 cm) un verre de 25 cl d'un
mélange $\frac{3}{4}$ de bière, $\frac{1}{4}$ de vin blanc
et une cuillère à soupe de sirop de
cassis ou de grenadine.
Changer le contenu 2 fois par mois.

Suspendre la bouteille entre 1.5 m et 2.0 m exposition sud
- au printemps : à proximité de camélias, cotonéaster, sous
les terrasses, les abris et cabanons entre 2 ruches ...
- par la suite : à proximité des arbustes en fleur et fruitiers

FABRICATION DU PIÈGE À FRELON



Percer 3 trous (diamètre 8.5mm)
Aux 2 /3 de la hauteur
à l'aide d'une pointe chauffée
ou un fer à souder.
Badigeonner ces derniers avec
du sirop de grenadine ou de cassis

Remplir le fond de la bouteille
(max 4 cm) un verre de 25 cl d'un
mélange $\frac{3}{4}$ de bière, $\frac{1}{4}$ de vin blanc
et une cuillère à soupe de sirop de
cassis ou de grenadine.
Changer le contenu 2 fois par mois.

Suspendre la bouteille entre 1.5 m et 2.0 m exposition sud
- au printemps : à proximité de camélias, cotonéaster, sous
les terrasses, les abris et cabanons entre 2 ruches ...
- par la suite : à proximité des arbustes en fleur et fruitiers



Pour participer au relevé de capture des
frelons asiatiques, scannez le QR Code



Ou <https://www.oloron-ste-marie.fr/luttons-ensemble-contre-le-frelon-asiatique/>



Pour participer au relevé de capture des
frelons asiatiques, scannez le QR Code



Ou <https://www.oloron-ste-marie.fr/luttons-ensemble-contre-le-frelon-asiatique/>

Arrivés en France en 2002, les frelons asiatiques se sont adaptés à notre environnement et représentent un danger pour les humains, les animaux, les abeilles... Les piéger est donc une démarche citoyenne et de santé publique !

QUAND PIÉGER ?

- De fin février (lorsque la température atteint entre 13 à 18°) au mois de mai : piégeage des fondatrices qui sortent de leur hibernation.
- De mai à septembre : piégeage des ouvrières pour affaiblir les colonies
- D'octobre à novembre : piégeage pour capturer les futures reproductrices.
- Décembre : mort des ouvrières.

CONSEIL DE L'APICULTEUR

Laisser les premières captures macérer dans le mélange : elles produiront des phéromones qui attireront leurs congénères en plus de l'appât.

Changer le mélange deux fois par mois, ne pas laver le piège et remettre de nouveau de l'appât avec quelques frelons morts.

Un nid peut donner naissance à de très nombreuses reines qui généreront 15 à 30 nids l'année qui suit.
Un nid peut compter de 1500 à 3000 frelons ou plus.

À SAVOIR

- Les nids désaffectés après décembre ne seront plus jamais utilisés. Il n'est donc pas nécessaire de les détruire.
- L'appât conseillé est assez sélectif. Il peut piéger aussi d'autres insectes mais il s'agit essentiellement de pyrales et de noctuelles qui sont d'autres prédateurs des cultures.
- Les frelons bâtissent leur nid de préférence dans des points hauts, mais désormais 30 à 40% des nids se trouvent aussi à hauteur d'homme, dans les haies, les cabanons, les dessous de toits...

Une prise de conscience citoyenne est nécessaire pour participer au piégeage afin de limiter la prolifération du frelon asiatique.

Cette action est coordonnée au niveau intercommunal par un comité de défense regroupant des référents dans chaque commune.
En savoir plus en appelant la CCHB au 05 59 10 35 70

Arrivés en France en 2002, les frelons asiatiques se sont adaptés à notre environnement et représentent un danger pour les humains, les animaux, les abeilles... Les piéger est donc une démarche citoyenne et de santé publique !

QUAND PIÉGER ?

- De fin février (lorsque la température atteint entre 13 à 18°) au mois de mai : piégeage des fondatrices qui sortent de leur hibernation.
- De mai à septembre : piégeage des ouvrières pour affaiblir les colonies
- D'octobre à novembre : piégeage pour capturer les futures reproductrices.
- Décembre : mort des ouvrières.

CONSEIL DE L'APICULTEUR

Laisser les premières captures macérer dans le mélange : elles produiront des phéromones qui attireront leurs congénères en plus de l'appât.

Changer le mélange deux fois par mois, ne pas laver le piège et remettre de nouveau de l'appât avec quelques frelons morts.

Un nid peut donner naissance à de très nombreuses reines qui généreront 15 à 30 nids l'année qui suit.
Un nid peut compter de 1500 à 3000 frelons ou plus.

À SAVOIR

- Les nids désaffectés après décembre ne seront plus jamais utilisés. Il n'est donc pas nécessaire de les détruire.
- L'appât conseillé est assez sélectif. Il peut piéger aussi d'autres insectes mais il s'agit essentiellement de pyrales et de noctuelles qui sont d'autres prédateurs des cultures.
- Les frelons bâtissent leur nid de préférence dans des points hauts, mais désormais 30 à 40% des nids se trouvent aussi à hauteur d'homme, dans les haies, les cabanons, les dessous de toits...

Une prise de conscience citoyenne est nécessaire pour participer au piégeage afin de limiter la prolifération du frelon asiatique.

Cette action est coordonnée au niveau intercommunal par un comité de défense regroupant des référents dans chaque commune.
En savoir plus en appelant la CCHB au 05 59 10 35 70